

## RELACIONES ENTRE HIFOMICETOS ACUÁTICOS Y VEGETACIÓN DE RIBERA EN EL RÍO VINALOPÓ (ALICANTE, ESPAÑA)<sup>1</sup>

A. ROLDÁN y M. HONRUBIA

Dpto. Botánica. Fac. Biología. Univ. Murcia.  
30100 Murcia. España.

**RESUMEN** - Se ha realizado un estudio de la colonización de 9 sustratos diferentes en dos puntos del río Vinalopó (Alicante, España); próximos a la cabecera y desembocadura respectivamente y con físico-química de las aguas y vegetación de ribera bien diferenciadas. El número de especies fúngicas que coloniza los sustratos en la cabecera es mucho mayor (18 especies) que en la desembocadura (6 especies). Trece especies parecen ser exclusivas de la cabecera mientras que sólo una lo es de la desembocadura. Mediante el trasplante de cebos previamente colonizados, se ha comprobado que 6 especies que no forman parte de la micoflora de la desembocadura pueden sobrevivir en ésta, e incluso, conservan su capacidad esporulativa. La naturaleza del sustrato no es el factor determinante de las variaciones en la flora fúngica del río Vinalopó. En este sentido, parecen tener una mayor incidencia los cambios en la composición físico-química del agua.

**RÉSUMÉ** - La colonisation par les hyphomycètes aquatiques de 9 substrats différents a été étudiée en deux points du río Vinalopó (Alicante, Espagne), à proximité de la source d'une part et de l'embouchure d'autre part. Les qualités physico-chimiques de l'eau et de la végétation riveraine y sont très différentes. Le nombre d'espèces colonisatrices vers la source est bien plus élevé (18 espèces) que vers l'embouchure (6 espèces). Treize paraissent exclusives de la partie haute tandis que une seule l'est pour l'embouchure. En transplantant des supports préalablement colonisés, il a été prouvé que 6 espèces étrangères à la flore de l'embouchure peuvent y survivre et de plus conservent leur pouvoir de sporulation. La nature du substrat n'est pas le facteur déterminant des variations de la mycoflore du río Vinalopó. Il semble que l'influence principale résulte de la composition physico-chimique de l'eau.

**MOTS CLÉS** : Hyphomycètes aquatiques, Espagne, río Vinalopó

<sup>1</sup> Trabajo presentado en el IV Congreso Español de Limnología, Sevilla 5-8 mayo de 1987. Trabajo subvencionado por el Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert" de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

## INTRODUCCIÓN

Existe un desconocimiento general sobre los factores ambientales que influyen en la distribución de los hifomicetos acuáticos. Se ha observado que muchas especies de estos hongos aparecen indistintamente en cursos de aguas básicas o ácidas; otras, en cambio, son específicas de cada tipo. En laboratorio, sin embargo, no se ha encontrado ninguna relación convincente entre los cambios de pH y los óptimos de crecimiento de estos hongos (Rosset & Bärlocher, 1985).

Otra hipótesis considera la distribución como una consecuencia directa de cambios biológicos ambientales. Es de esperar que la mayor cantidad de especies se presente en los lugares donde la permanencia de materia vegetal sea prolongada. Esto puede ser debido a un descenso en la actividad depredadora de invertebrados; a una disminución del transporte de materia vegetal curso abajo o, más indirectamente, a una disminución en el peso de partículas finas en suspensión que, cuando sedimentan sobre el sustrato, disminuyen el suministro de oxígeno necesario para la colonización de la materia vegetal (Bärlocher, 1982). Estos 3 factores son bastante evidentes en arroyos ácidos, y probablemente explican la gran diversidad de especies que presentan. Sin embargo, la magnitud de éste u otros mecanismos es, hasta ahora, desconocida.

En otras ocasiones, se ha intentado explicar las variaciones en la diversidad y paulas de distribución de hifomicetos acuáticos como consecuencia indirecta de la latitud (Webster & Descals, 1981). Incluso se han clasificado estos hongos atendiendo a dicha premisa (Nilsson, 1964).

En el presente trabajo se planteó la posibilidad de que el sustrato aportado por la vegetación de ribera influyera decisivamente en la naturaleza del componente fúngico descomponedor. Para comprobar esta hipótesis se escogió el río Vinalopó donde, en estudios previos, se comprobó una marcada variación en la distribución longitudinal de microhongos saprófitos. La cabecera del río, con saucedas bien conservadas, presenta una diversidad en su flora fúngica mucho mayor que las zonas de curso bajo, con unas riberas muy degradadas donde predominan especies halófilas y carrizales.

El río Vinalopó transcurre en todo su recorrido por la provincia de Alicante. Atraviesa una de las zonas con mayor presión demográfica de la Península. Este hecho, unido a la gran incidencia de los vertidos producidos por la industria de manufacturas, provoca una progresiva degradación del río; hasta tal punto que, en varios tramos, las posibilidades de actividad biológica son prácticamente nulas.

## MATERIAL Y MÉTODOS

Se han escogido dos puntos ubicados en las proximidades de Bañeres y Elche, localidades cercanas, respectivamente, al nacimiento y desembocadura del río: localidad 1. Río Vinalopó en Bañeres. YH 8604. 820msm; localidad 2. Río Vinalopó en Elche. YH 4000. 100msm. El estudio se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre. En este espacio de tiempo, se tomaron muestras de agua para la caracterización físico-química de las estaciones. El resultado de este análisis está recogido en la tabla I.

		T °C	pH	O <sub>2</sub> ml/l	Conduc. uS	Alcal. meq/l	Sol. sus. g/l	Fosfatos ug-at./l	Nitritos ug-at./l	Nitratos ug-at./l	Cloruros meq/l
Bañeres	Nov.	14.2	7.6	5	270	5.08	0.007	0.41	0	92.3	0.0141
	Dic.	11	8.06	4.9	270	4.9	0.004	0.27	0	141.2	0.0084
Elche	Nov.	13.5	8.7	10	9000	5.72	0.06	5.41	0	708.5	0.1579
	Dic.	12	8.17	5.9	9000	6.17	0.0055	108.37	0.01	1386.9	0.141

Tabla 1 - Resultados del análisis físico-químico del río Vinalopó en Bañeres y Elche en los meses de noviembre y diciembre.

Tableau 1 - Résultats de l'analyse physico-chimique du Vinalopó à Bañeres et Elche aux mois de novembre et décembre.

El estudio del componente fúngico asociado a los distintos sustratos se llevó a cabo mediante la implantación de cebos artificiales. Estos cebos se prepararon con hojas recolectadas en las partes vivas de 9 plantas diferentes, escogidas entre las más características de la vegetación de ribera. Cinco de los cebos corresponden a plantas procedentes de la localidad 1 (*Populus nigra*, *Rubus ulmifolius*, *Salix atrocinerea*, *Schoenus nigricans* y *Ulmus minor*); los 4 restantes de la localidad 2 (*Phragmites communis*, *Populus euphratica*, *Salicornia* sp. y *Tamarix gallica*). Los diversos grupos de hojas se dispusieron en bolsas de malla independientes. Se escogió una luz de 3mm, de tal modo que permitiera el paso de invertebrados, y así minimizar el grado de interferencia en los procesos naturales de colonización.

Dos paquetes constituidos por las bolsitas de cada uno de los nueve cebos se fijaron al lecho del río en zonas de máxima corriente en ambas localidades. Las fechas de colocación y recogida vienen indicadas, para cada caso, en la descripción de las diversas experiencias realizadas.

Para la identificación de las especies fúngicas se utilizó el cultivo en aireación. Una descripción detallada del proceso se recoge en Roldán & al. (1987a). En el caso de especies conflictivas se procedió a su estudio en cultivo puro, siguiendo las técnicas descritas por Descals & al. (1977) y Descals (1987).

#### Descripción de las diferentes experiencias

EXPERIMENTOS 1 y 2 - Se colocan sendos paquetes de cebos en las localidades 1 y 2. Fecha de colocación: 3/11/86. Fecha de recogida: 17/11/86. Con esta experiencia se pretende comprobar en que grado la diversidad del componente fúngico se ve afectada por el carácter autóctono o alóctono del sustrato.

EXPERIMENTO 3 - Una vez comprobado que los cebos dispuestos en la localidad 1 presentan un mayor número de especie fúngicas, se procede a una segunda colocación de estos mismos cebos en la localidad 2. El objeto es cuantificar el grado de supervivencia de aquellas especies que, no encontradas en

Sustratos en localidad 1

experiencia		Salix atrocinerea				Rubus ulmifolius				Populus nigra				Schoenus nigricans				Ulmus minor			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	<i>Tetracladium marchalianum</i>	x	x	x	■	x	x	x	x	x	x	x		■		x	x	x		x	x
2	<i>Alatospora acuminata</i>	x	x	x		x		x		x	x			x	x	x		x		x	
3	<i>Heliscus lugdunensis</i>	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		■				x	x	x	x
4	<i>Fusarium culmorum</i>	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x	x						
5	<i>Tricladium angulatum</i>	x	x	x	x	x		x		■		x									
6	<i>Fusarium aqueductum</i>	x	x	x		x		x		x	x			x	x	x		x	x	x	
7	<i>Anguillospora longissima</i>	x	x			x	x			x	x	x		■		x		■			
8	<i>Clavariopsis aquatica</i>	x	x			x	x			x	x			x	x						
9	<i>Cylindrocarpon</i> sp.	x	x			x				x	x										
10	<i>Tetracladium setigerum</i>	x								■		x		■							
11	<i>Tetracladium apiense</i>	■	x							■											
12	<i>Tricellula aquatica</i>	x	x																		
13	<i>Lemonniera aquatica</i>	■				x				x								■			
14	<i>Lunulospora curvula</i>	■																■			
15	<i>Articulospora antipodes</i>																				
16	<i>Dendrospora polymorpha</i>	x																			
17	<i>Lateranulosa unilobata</i>	x																			
18	<i>Tetracladium furcatum</i>	■																			
19	<i>Triscelophorus monosporus</i>																				
		16	6	11	4	8	4	4	5	10	2	6	7	7	3	4	2	7	2	4	3
		22				13				12				10				9			

Tabla 2 - Especies fúngicas identificadas en cada una de las experiencias. (1) capaces de esporular en localidad 2, (2) incapaces de esporular en localidad 2.

la localidad 2, se introducían ahora con los cebos de la localidad 1. Fecha de colocación: 22/12/86. Fecha de recogida: 30/12/86.

EXPERIMENTO 4 - Paralelamente al desarrollo del experimento anterior, se dispuso en la localidad 2 un nuevo paquete con cebos vírgenes. En este caso se intercalaron pequeñas bolsas de malla con restos colonizados por las especies aparecidas en la localidad 1. Se pretende comprobar qué especies típicas de la localidad 1 pueden continuar su desarrollo en la 2 de modo activo. Es decir, cuáles son capaces de colonizar los cebos vírgenes.

Sustratos en localidad II

Tamarix gallica				Populus euphratica				Salicornia sp.				Phragmites communis				freq. 1-2	Rango	freq. 3-4
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	14	1	17
x	x			x				x	x			x	x			14	2	7
x				x				x	x	x				x		12	3	13
x	x			x	x									x	x	11	4	7
x				x				x	x							10		5
x	x			x	x					x		x	x			8		12
x	x			x	x			x		x						8	7	8
				x				x				x	x					6
x	x			x												5	10	4
x				x													11	
				x												3	13	1
																1	15	1
x								x				x					9	
x				x												4	12	0
								x				x				2	14	
																1	16	0
																1	17	0
																1		0
x																1	19	
12 4	5	3		12 3	9	4		8	3	3	1	6	3	3	4			
15				15				11				9						

En localidad 1 y 2

En localidad 1

(1)

Solo en localidad II

(2)

Tableau 2 - Espèces fongiques identifiées au cours des expérimentations. (1) capables de sporuler dans la localité 2, (2) incapables de sporuler dans la localité 2.

RESULTADOS Y DISCUSION

En la tabla 2 se resumen los resultados obtenidos. En vertical se enumeran las especies fúngicas identificadas. En horizontal aparecen los sustratos utilizados. Para cada sustrato se indica los hongos detectados en cada una de las experiencias detalladas en el apartado anterior.

Con las experiencias 1 y 2 se identificaron 18 táxones fúngicos en Bañeres (táxones 1 a 5 y 7 a 19) y 6 en Elche (táxones 1 a 6). Como especies más frecuentes resultan: *Anguillospora longissima*, *Clavariopsis aquatica*, *Cylindrocarpon* sp., *Lemonniera aquatica*, *Lunulospora curvula*, *Tetracladium apiense* y *Tetracladium setigerum* (todas específicas de la localidad 1); además de las 5 especies comunes a ambas localidades: *Alatospora cuminata*, *Heliscus lugdunensis*, *Tetracladium marchalianum* y *Tricladium angulatum*, *Fusarium aquaeductum* se revela como el más abundante en la localidad 2.

No se ha cuantificado la incidencia relativa de cada especie fúngica en el proceso de colonización de cada sustrato; pero a modo de generalización, puede decirse que, mientras en Bañeres no se puede mencionar ningún hongo como dominante, en Elche el predominio es claro para los representantes del género *Fusarium* y, en menor medida, *Tetracladium marchalianum*.

El resto de especies no mencionadas aparece sólo en Bañeres. Aunque no tienen una gran incidencia desde el punto de vista cuantitativo, sí tienen una gran importancia cualitativa, ya que son especies consideradas generalmente como típicas de la micoflora de aguas puras. Cabe destacar la presencia de *Laterivramulosa uninflata*, descrita en medio terrestre (Matsushima, 1971) pero habitual en muestras de espuma. *Dendrospora polymorpha* es una especie recientemente descrita a partir de conidios en espumas del Río Mundo (Albacele) (Roldán & al., 1987b). En este trabajo se cita por primera vez sobre sustrato natural (hojas sumergidas de *Salix atrocinerea*).

Los cebos constituidos por hojas de plantas arbóreas tienen una mayor variedad de hongos saprófitos. *Salix atrocinerea*, con 16 especies fúngicas, se erige como el que mayor diversidad soporta; hecho este que coincide con los resultados de trabajos anteriores (Roldán & al., 1987a). Por el contrario, los sustratos herbáceos muy lignificados suelen tener una pobre composición de su flora fúngica. En este sentido cabe mencionar a *Schoenus nigricans* y *Phragmites communis*, con 8 y 9 especies, respectivamente.

El carácter autóctono del sustrato no parece tener ninguna incidencia en el aumento de la diversidad de la flora fúngica saprófita. Tomando como referencia la localidad 1 (la más rica en especies), se comprueba que sustratos alóctonos como *Populus euphratica* y *Tamarix gallica* soportan un número de especies similar, y a veces superior, al de los autóctonos.

La tasa de supervivencia de las especies introducidas en la localidad 2 es considerablemente baja. Con excepción hecha de las 6 especies propias de la micoflora del río Vinalopó en Elche, sólo *Anguillospora longissima*, *Clavariopsis aquatica*, *Cylindrocarpon* sp., *Tetracladium apiense* y *Tricellula aquatica* demuestran su viabilidad en las nuevas condiciones; aunque posiblemente no permanezcan activos ya que, de las 5 especies mencionadas, sólo *Anguillospora longissima* fue capaz de producir nueva colonización.

Por el contrario, *Tetracladium setigerum*, que no había sido detectada en los experimentos de supervivencia, se comprobó que podía producir una nueva colonización.

#### LISTADO DE ESPECIES

- Tetracladium marchalianum* de Wildeman
- Alutospora acuminata* Ingold
- Heliscus luydunensis* Sacc. & Therry
- Fusarium culmorum* (W.G. Smith) Sacc.
- Tricladium angulatum* Ingold
- Fusarium aquaeductum* (Radl. & Rab.) Sacc.
- Anguillospora longissima* (Sacc. & Sydow) Ingold
- Clavariopsis aquatica* de Wildeman
- Cylindrocarpon* sp.
- Tetracladium setigerum* (Grove) Ingold

*Tetracladium aptense* Sinclair & Eicker  
*Tricellula aquatica* Webster  
*Lemonnifera aquatica* de Wildeman  
*Lunulospora curvula* Ingold  
*Articulospora antipodes* sp. ined. Roldán & Aimer  
*Dendrospora polymorpha* Roldán & Descals  
*Lateriramulosa uniuinflata* Matsushima  
*Tetracladium furcatum* Descals  
*Triscelophorus monosporus* Ingold  
  
*Salix atrocinerea* Brot.  
*Rubus ulmifolius* Schott  
*Populus nigra* L.  
*Schoenus nigricans* L.  
*Ulmus minor* Miller  
*Tamarix gallica* L.  
*Populus euphratica* Olivier  
*Salicornia* sp.  
*Phragmites communis* Trin.

### CONCLUSIONES

Con las experiencias 1 y 2 se ha puesto de manifiesto que la riqueza en especies de la flora fúngica es mucho mayor en el nacimiento del río Vinalopó que en su tramo bajo. El tipo de sustrato no es un factor determinante, ya que no se aprecian variaciones significativas entre sustratos autóctonos y alóctonos.

La mayoría de las especies exclusivas del tramo de cabecera son incapaces de sobrevivir cuando son trasladadas al tramo bajo. Sin embargo, algunos de estos hongos tienen una elevada tasa de supervivencia y son capaces, incluso, de producir una nueva colonización. Cabe preguntarse, pues, cual es el factor que impide su presencia natural en el río Vinalopó en Elche. El tipo de sustrato ha quedado de manifiesto que no es un factor excluyente. Tampoco las características físico-químicas del agua parecen tener una incidencia negativa para estas especies, en particular para aquellas que son capaces de producir nueva colonización. Los parámetros físico-químicos sí pueden afectar la viabilidad de aquellos hongos que, comprobada su tasa de supervivencia, no son capaces de producir nueva colonización. Posiblemente, estos hongos permanezcan en estado criptico (con estructuras de resistencia tipo esclerocio) o simplemente vegetativo, con la capacidad de esporulación mermada o anulada.

No parece, en cambio, que exista ningún inconveniente para que *Tetracladium setigerum* o *Tricellula aquatica* formen parte de la micoflora del río en Elche. Posiblemente su ausencia estriba en la escasa capacidad de competencia con los hongos autóctonos en las mismas condiciones. No hay que olvidar que, en la experiencia 4, las condiciones eran netamente favorables para las especies fúngicas alóctonas, ya que se dispuso material previamente colonizado entre los cebos vírgenes, con lo que se influyó en gran medida en el proceso natural de colonización. En otro sentido, es posible que el factor impedimento resida, no ya en el agua sino en las riberas. No se conoce el teleomorfo de ninguna de las dos especies mencionadas. Quizá la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo del teleomorfo impida la presencia natural del anamorfo.

A modo de conclusión se puede afirmar que la distribución longitudinal de los hongos descomponedores en el Río Vinalopó no es consecuencia directa de la naturaleza del sustrato. Se observa un proceso selectivo en el que posiblemente intervengan diversos factores, aunque la incidencia más clara parece residir en los caracteres físico-químicos del agua, principalmente Conductividad, Fosfatos, Nitratos o Cloruros. Actualmente se está procediendo al estudio de la variación estacional y temporal de los hifomicetos acuáticos en relación con los cambios físico-químicos del medio, cuyos datos se encuentran actualmente en periodo de elaboración.

#### AGRADECIMIENTOS

Nuestro mayor reconocimiento al Instituto de Estudios "Juan Gil-Albet" de Excmo. Diputación Provincial de Alicante por el soporte económico que permitió el desarrollo de este trabajo. Al Dr. E. Descals (Mallorca) por la revisión crítica de este manuscrito. A Gisela Díaz y Pilar Torres por su ayuda con los análisis físico-químicos.

#### BIBLIOGRAFÍA

- BÄRLOCHER F., 1982 - On the ecology of Ingoldian fungi. *Bioscience* 32: 581-586.
- DESCALS E., WEBSTER J. and DYKO B.J., 1977 - Taxonomic studies on aquatic hyphomycetes. I. *Lemonniera* De Wildeman. *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 69: 89-109.
- DESCALS E., 1987 - Muestreo preliminar de los hongos ingoldianos de Cataluña. *Revista Ibér. Micol.* 4: 17-32.
- MAITSUSHIMA T., 1971 - *Microfungi of the Solomon Islands and Papua, New Guinea*. Kobe, Shionogi Research Lab., Shionogi & Co. Ltd., 78p.
- NILSSON S., 1964 - Freshwater hyphomycetes: taxonomy, morphology and ecology. *Symb. Bot. Upsal.* 18: 1-130.
- ROLDAN A., DESCALS E. y HONRUBIA M., 1987a - Notas sobre hifomicetos acuáticos saprófitos en restos vegetales. *Cryptogamie, Mycol.* 8: 61-66.
- ROLDAN A., DESCALS E. and HONRUBIA M., 1987b - *Dendrospora polymorpha* sp. nov. A new hyphomycete from Spanish streams. *Mycotaxon* 29: 21-27.
- ROSSET J. and BÄRLOCHER F., 1985 - Aquatic hyphomycetes: influence of pH,  $CA^{2+}$  and  $HCO_3^-$  on growth in vitro. *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 84: 137-145.
- WEBSTER J. and DESCALS E., 1981 - Morphology, distribution and ecology of conidial fungi in freshwater habitats. In: Cole G.T. & Kendrick B., *The Biology of Conidial Fungi*. New York, Academic Press: 295-355.